

PROTHÈSE FIXE

PÉRIODE D'ADAPTATION

Après la pose de la prothèse, il faudra un certain temps pour s'habituer à la nouvelle situation.

De légers symptômes peuvent survenir:

- Sensation de pression sur la gencive: elle est possible lors de la première mise en place de la prothèse. Cela se remettra spontanément.
- Difficulté à prononcer certains sons: il est conseillé de lire à haute voix devant un miroir et de s'écouter. En peu de temps, vous acquerrez un discours clair et fluide.
- Une sensation d'occupation ou un corps étranger qui disparaîtra tout seul car la langue s'adaptera au nouvel espace.
- Une augmentation légère et transitoire de la quantité de salive, ainsi que la tendance à se mordre les joues et la langue mais en peu de temps, vous apprendrez à l'éviter.
- Vous pouvez remarquer un léger changement dans votre apparence et votre expression à la suite de votre réhabilitation, dans quelques semaines, vous vous habituerez à votre nouvelle image.

RECOMMANDATIONS PENDANT QUE VOUS MANGEZ

Évitez de fendre les aliments très durs, qui ne doivent pas non plus être mordus avec des dents naturelles.

RECOMMANDATIONS D'HYGIÈNE

L'hygiène de la bouche et de la prothèse doit être effectuée immédiatement après chaque repas.

Le nettoyage sera effectué:

- Dans les parties accessibles : avec brosse à dents et dentifrice, et fil dentaire
- Dans les espaces entre les dents et les gencives avec des brosses inter proximales